

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 22/07/2021 | Edição: 137 | Seção: 1 | Página: 4

Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Gabinete da Ministra

PORTARIA INTERMINISTERIAL MAPA/MMA Nº 10, DE 21 DE JULHO DE 2021

Institui lista de espécies nativas da sociobiodiversidade de valor alimentício, para fins de comercialização in natura ou de seus produtos derivados.

Os MINISTROS DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO e DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhes conferem o inciso II, do parágrafo único, do art. 87, da Constituição Federal, tendo em vista o disposto nos arts. 21 e 39 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, na Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, na Portaria Interministerial MDA/MDS/MMA nº 239, de 21 de julho de 2009, resolvem:

Art. 1º Instituir a lista de espécies nativas da sociobiodiversidade de valor alimentício, para fins de comercialização in natura ou de seus produtos derivados, no âmbito das operações realizadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, previsto pela Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, pela Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade - PGPMBio, da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, previsto na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, e outros Programas e Políticas que demandarem informações análogas, constante do Anexo desta Portaria.

Parágrafo único. Para fins desta Portaria, entende-se por:

I - sociobiodiversidade: inter-relação entre a diversidade biológica e a diversidade de sistemas socioculturais; e



II - produtos da sociobiodiversidade: bens e serviços (produtos finais, matérias-primas ou benefícios) gerados a partir de recursos da biodiversidade, voltados à formação de cadeias produtivas de interesse dos povos e comunidades tradicionais e de agricultores familiares, que promovam a manutenção e valorização de suas práticas e saberes, e assegurem os direitos decorrentes, gerando renda e promovendo a melhoria de sua qualidade de vida e do ambiente em que vivem.

Art. 2º A lista será composta pelas espécies constantes do Anexo desta Portaria e por seus derivados.

Parágrafo único. As espécies listadas no Anexo desta Portaria e classificadas nas categorias Em Perigo (EN) e Vulnerável (VU) pela Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014, tratando-se de produtos florestais não madeireiros, tais como sementes, folhas e frutos, poderão ser utilizadas desde que sejam adotadas as providências previstas na referida Portaria e diplomas alteradores.

Art. 3º Fica revogada a Portaria Interministerial MMA/MDS nº 284, de 30 de maio de 2018.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor em 2 de agosto de 2021.

TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

JOAQUIM ÁLVARO PEREIRA LEITE
Ministro de Estado do Meio Ambiente

ANEXO

ANEXO

ESPÉCIES NATIVAS DA SOCIOBIODIVERSIDADE BRASILEIRA DE VALOR ALIMENTÍCIO

Nome Popular	Nome Científico	Família	Partes mais utilizadas e exemplos de uso	Distribuição geográfica natural das espécies - regiões/estados	Situação de Cultivo
Abacaxi	<i>Ananas comosus</i>	Bromeliaceae	Fruto (casca para chá, fermentados); Polpa do fruto (<i>in natura</i> , assada, cristalizada, doce em calda, geleia, sorvete e suco)	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Cultivada
Abiu	<i>Pouteria calmito</i>	Sapotaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (doce, geleia, mousse, purê, sorvete, suco, torta)	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, SE); Centro-Oeste (MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, SC)	Colhida na natureza e cultivada
Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	Arecaceae	Palmito ; Polpa do fruto (bombom, doce, fermentado, geleia, licor, molho, polpa congelada, pudim, sorvete, suco, vinho e, inclusive, cerveja e vinho)	Norte (AP, PA, TO); Nordeste (MA)	Colhida na natureza, cultivada e com programas de melhoramento
Açaí-solteiro	<i>Euterpe precatoria</i>	Arecaceae	Palmito ; Polpa do fruto (bombom, doce, fermentado, geleia, licor, molho, polpa congelada, pudim, sorvete, suco, vinho e, inclusive, cerveja e vinho)	Norte (AC, AM, PA, RO)	Colhida na natureza
Amendoim ¹	<i>Arachis hypogaea</i>	Fabaceae	Semente (<i>in natura</i> , barra de cereais, biscoito, bolo, bombom, caramelizado, doce, leite, manteiga, óleo, paçoca, pé de moleque, sorvete - ou torrada (natural, doce, salgado))	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Cultivada
Amora-preta	<i>Rubus brasiliensis</i> ; <i>R. erythrocldos</i> ; <i>R. rosifolius</i> ; <i>R. sellowii</i>	Rosaceae	Folha (chá, em pó); Fruto (<i>in natura</i> , cheesecake, doce em calda, geleia, licor, iogurte, mousse, sorvete, suco)	Norte (TO); Nordeste (AL, BA, CE, PB, PE, RN, SE); Centro-Oeste (DF, GO); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Colhida na natureza e cultivada
Araçá	<i>Psidium cattleianum</i> ; <i>P. guineense</i>	Myrtaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (compota, doce pastoso, doce de corte, geleia, iogurte, licor, molho, mousse, polpa congelada, sorvete, suco, torta)	Norte (AC, AM, AP, PA); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN, SE); Centro-Oeste (GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Colhida na natureza e cultivada
Araçá-boi	<i>Eugenia stipitata</i>	Myrtaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (compota, doce pastoso, doce de corte, frizante, geleia, iogurte, licor, molho, mousse, polpa congelada, purê, sorvete, suco, torta)	Norte (AC, AM, PA, RO); Centro-Oeste (MT)	Colhida na natureza
Araçá-pera	<i>Psidium acutangulum</i>	Myrtaceae	Fruto (<i>in natura</i> , cristalizado); Polpa do fruto (doce, geleia, molho, mousse, polpa congelada, sorvete, suco, torta)	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO); Centro-Oeste (MT); Sul (PR)	Colhida na natureza
Araticum, Panã	<i>Annona crassiflora</i>	Annonaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (doce, geleia, iogurte, licor, sorvete, suco, torta)	Norte (PA, TO); Nordeste (BA, MA, PI); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (MG e SP); Sul (PR)	Colhida na natureza
Araucária, Pinheiro-brasileiro, Pinheiro-do-paraná	<i>Araucaria angustifolia</i>	Araucariaceae	Broto s (picles); Semente (<i>in natura</i> , biscoito, bolo, creme, farinha, farofa, licor, paçoca, pães, pudim, rocambolo, sopa, sorvete, suflê); Semente (assada ou cozida)	Sudeste (MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Colhida na natureza
Ariá	<i>Goeppertia allouia</i>	Marantaceae	Raiz (cozida com casca e, então, descascada). Se cozidas com sal, podem ser consumidas diretamente. Podem ser usadas para purê, salada, ensopado, caramelizada e fatiadas e fritas). A raiz crua pode ser usada para o preparo de chips. Inflorescências jovens também podem ser utilizadas	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO); Nordeste (MA); Centro-Oeste (GO, MT)	Colhida na natureza e cultivada
Aroeira-pimenteira	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Anacardiaceae	Fruto (aroma e condimento). Uso comum em diversos pratos, a exemplo de carnes, peixes, doce em calda, geleia, além de bombom	Norte (AP, PA, TO); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Colhida na natureza e cultivada
Arumbeva	<i>Opuntia elata</i> ; <i>O. monacantha</i>	Cactaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (doce, geleia, iogurte, licor, molho, mousse, sorvete, suco, torta)	Nordeste (BA, CE, SE); Centro-Oeste (MS); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Colhida na natureza
Babaçu	<i>Attalea speciosa</i>	Arecaceae	Amêndoa (<i>in natura</i> , cocada, doce, flocos, leite, óleo, pudim, sorvete ou torrada); Polpa do fruto (farinha – bolo, mingau, pão, pudim)	Norte (AC, AM, PA, RO, TO); Nordeste (BA, CE, MA, PI); Centro-Oeste (GO, MS, MT); Sudeste (MG)	Colhida na natureza
Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i> ; <i>O. balickii</i> ; <i>O. distichus</i> ; <i>O. mapora</i> ; <i>O. minor</i>	Arecaceae	Amêndoa (óleo); Palmito (das espécies que perfilham); Polpa do fruto (geleia, mousse, óleo comestível, sorvete, suco, vinho de bacaba)	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, TO); Nordeste (MA); Centro-Oeste (GO, MT)	Colhida na natureza
Bacupari	<i>Garcinia brasiliensis</i> ; <i>G. madruno</i>	Clusiaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (doce, frizante, geleia, iogurte, licor, molho, mousse, polpa congelada, sorvete, suco, torta)	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, TO); Nordeste (BA, MA); Centro-Oeste (GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP)	Colhida na natureza
Bacuri	<i>Platonia insignis</i>	Clusiaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (doce, geleia, iogurte, licor, molho, mousse, sorvete, suco, torta)	Norte (AM, AP, PA, RR, TO); Nordeste (MA, PI)	Colhida na natureza, cultivada e com programas de melhoramento
Baru, Cumbaru	<i>Dipteryx alata</i>	Fabaceae	Amêndoa - <i>in natura</i> (farinha, leite, óleo) ou torrada (consumo direto, barra de cereais, biscoito, bolo, doces em barra, farofa, óleo, paçoca, rapadura, pé-de-moleque e fabrico de cerveja)); Polpa do fruto - <i>in natura</i> (doce, farinha, geleia, licor, óleo, sorvete)	Norte (RO, TO); Nordeste (BA, MA); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (MG, SP)	Colhida na natureza
Beldroega	<i>Portulaca oleracea</i>	Portulacaceae	Folhas ; Ramos jovens - <i>in natura</i> (consumo direto), salada, picles ou cozida (bolinho, ensopado, omelete, picles, refogado, salada, tempurá, torta salgada); Semente (pão)	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Cultivada
Biribá	<i>Annona mucosa</i>	Annonaceae	Polpa do fruto - <i>in natura</i> (doce, geleia, iogurte, licor, mousse, polpa congelada, sorvete, suco, torta)	Norte (AC, AM, PA, RO); Centro-Oeste (MT); Nordeste (BA); Sudeste (MG, RJ); Sul (RS)	Cultivada
Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	Arecaceae	Fruto (casca para chá); Medula do caule (fécula); Polpa do fruto (<i>in natura</i> , doce pastoso, doce de corte, farofa, frizante, geleia, óleo, pudim, sorvete, suco e como farinha, após secagem)	Norte (AC, AM, PA, RO, TO); Nordeste (BA, CE, MA, PI); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (MG, SP)	Colhida na natureza
Butiá	<i>Butia catarinensis</i> ; <i>B. eriospatha</i> ; <i>B. odorata</i> ; <i>B. yatay</i> ;	Arecaceae	Fruto (<i>in natura</i> , compota, infusão com aguardente, licor); Polpa do fruto (bolo, cocada, creme, doce, doce em calda, geleia, iogurte, molho, mousse, polpa congelada, pudim, recheio de bombom, recheio ou cobertura de cuca, sorvete, suco, torta); Amêndoa (óleo)	Sul (PR, RS, SC)	Colhida na natureza
Cacau	<i>Theobroma cacao</i>	Malvaceae	Amêndoa (torrada – cacau em pó, chocolate); Fruto (casca - preparo de chá); Fruto verde (fatiado como carpaccio - salada); Polpa do fruto/caroços (doce, geleia, mousse, sorvete, suco)	Norte (AC, AM, AP, PA, RO); Nordeste (BA, MA, SE); Sudeste (ES)	Cultivada
Cagaita	<i>Eugenia dysenterica</i>	Myrtaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (chutney, doce, geleia, licor, molho, mousse, polpa congelada, pudim, sorvete, suco, torta)	Norte (TO); Nordeste (BA, CE, MA, PE, PI); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (MG, SP)	Colhida na natureza
Cajá, (Taperebá)	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (creme, doce, geleia, iogurte, licor, molho, polpa congelada, sorvete, suco, torta). A polpa pode ainda ser usada na fabricação de cerveja	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP)	Colhida na natureza e cultivada
Caju	<i>Anacardium occidentale</i>	Anacardiaceae	Castanha - <i>in natura</i> (consumo direto, leite) ou torrada (consumo direto, barra de cereais, farofa, paçoca, pão);	Norte (AC, AM, AP, PA, RR, TO); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE); Centro-	Cultivada



			Pseudofruto (in natura, compota, doce, cristalizado, geleia, iogurte, licor, molho, polpa congelada, sorvete, suco)	Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP)	
Caju-do-cerrado	<i>Anacardium humile</i> ; <i>A. nanum</i>	Anacardiaceae	Castanha - <i>in natura</i> (consumo direto, leite) ou torrada (consumo direto, barra de cereais, farofa, paçoca); Pseudofruto (<i>in natura</i> , compota, doce, cristalizado, geleia, iogurte, licor, molho, passa, polpa congelada, sorvete, suco)	Norte (RO, TO); Nordeste (BA, PI); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (MG, SP), Sul (PR)	Colhida na natureza
Cambuci	<i>Campomanesia phaea</i>	Myrtaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Fruto (casca seca para chá); Polpa do fruto (doce, geleia, licor, molho agridoce, mousse, polpa congelada, pudim, sorvete, suco, torta)	Sudeste (MG, RJ, SP)	Colhida na natureza, com programas de melhoramento
Cambuí	<i>Myrciaria floribunda</i>	Myrtaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (doce, geleia, licor, molho, mousse, pudim, sorvete, suco, torta)	Norte (AC, AM, PA, RO, RR); Nordeste (AL, BA, PE); Centro-Oeste (GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Colhida na natureza, com programas de melhoramento
Camu-camu	<i>Myrciaria dubia</i>	Myrtaceae	Fruto (<i>in natura</i> , cristalizado, doce, geleia, iogurte, licor, molho agridoce, mousse, refresco, sorvete, suco, torta)	Norte (AC, AM, PA, RO, RR, TO); Centro-Oeste (MT)	Colhida na natureza, cultivada e com programas de melhoramento
Cará-amazônico	<i>Dioscorea trifida</i>	Dioscoreaceae	Túbera (bolo, doce, pão, pudim, purê). Pode ser servido após um simples cozimento em água e sal	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, TO); Nordeste (MA, PB, PE); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (MG)	Colhida na natureza e cultivada
Cará-de-espinho	<i>Dioscorea chondrocarpa</i>	Dioscoreaceae	Túbera (cozida com casca e, então, descascada). Pode ser usada para panificação, purê, sopa, além de fatiada e frita). Chips podem ser preparados a partir do tubérculo cru	Norte (AC, AM, PA, RO, TO); Nordeste (AL, BA, PB); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Colhida na natureza e cultivada
Carrapicho-agulha	<i>Bidens bipinnata</i>	Asteraceae	Folhas e Ramos terminais (caldos verdes, refogados, sopa). Usada também em saladas cruas, após rápido branqueamento). Pode acompanhar diferentes tipos de carnes. O uso para chás e fermentados são também opções	Norte (AM, AP, PA, RO, RR, TO); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN); Centro-Oeste (GO, MT); Sudeste (MG, SP); Sul (RS, SC)	Colhida na natureza
Castanha-de-cutia	<i>Acioa edulis</i>	Chrysobalanaceae	Amêndoa (in natura, assadas ou torradas, caramelizada ou triturada e misturada com água para obtenção de leite). A farinha obtida da trituração pode ser usada fresca ou para o preparo de beijú, bolo, doce, farofa, pães, paçoca, pudim, sorvete e em pratos de carnes vermelhas ou peixes	Norte (AM)	Colhida na natureza e cultivada
Castanha-de-galinha	<i>Acioa longipendula</i>	Chrysobalanaceae	Amêndoa (in natura, assadas ou torradas, caramelizada ou triturada e misturada com água para obtenção de leite). A farinha da trituração pode ser usada fresca ou para o preparo de beijú, bolo, doce, farofa, paçoca, pães, pudim, sorvete e em pratos de carnes vermelhas ou peixes	Norte (AM, PA)	Colhida na natureza e cultivada
Castanha-do-brasil/Castanha-do-pará	<i>Bertholletia excelsa</i>	Lecythidaceae	Castanha - <i>in natura</i> (consumo direto), bolo, doce, leite, sorvete ou torrada (barra de cereais, farofa, pão)	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR); Centro-Oeste (MT)	Colhida na natureza
Cereja-do-rio-grande	<i>Eugenia involucrata</i>	Myrtaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (doce, geleia, iogurte, licor, molho, sorvete, suco, torta)	Nordeste (AL, BA, PE, SE); Centro-Oeste (DF, GO, MS); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Colhida na natureza
Chichá	<i>Sterculia striata</i>	Malvaceae	Amêndoa - cozida ou torrada (barra de cereais, biscoito, bolo, doce, farofa, óleo, paçoca, pão, sorvete)	Norte (PA, TO); Nordeste (BA, CE, MA, PI); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP)	Colhida na natureza
Chicória-paraense, Chicória-do-pará, Coentrão	<i>Eryngium foetidum</i>	Apiaceae	Folhas (bolinho frito, ensopado, omelete, refogado, risoto). Muito usada na Amazônia como condimento ou tempero para peixe, sendo também especial no preparo do tacacá ou do tucupí	Norte (AC, AM)	Cultivada
Coquinho-azedo	<i>Butia capitata</i>	Arecaceae	Fruto (<i>in natura</i> , compota, licor); Polpa do fruto (doce, geleia, molho, mousse, polpa congelada, sorvete, suco, torta); Amêndoa (óleo)	Nordeste (BA); Centro-Oeste (GO); Sudeste (MG)	Colhida na natureza
Crem (Batata-crem)	<i>Tropaeolum pentaphyllum</i>	Tropaeolaceae	Folha ; Botões florais , Flor ; Frutos jovens (<i>in natura</i> , inclusive na forma de salada); Túbera (condimento (carne, sopa), conserva, pickles e molho, ou ainda cozidas, na forma de purê ou mesmo fritas)	Sudeste (RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Colhida na natureza e cultivada
Croá	<i>Sicana odorifera</i>	Cucurbitaceae	Fruto (casca para o preparo de chá); Fruto imaturo (usado como legume); Polpa do fruto (<i>in natura</i> ou em forma de creme, mousse, purê, refogado, sorvete, suco); Semente - torrada (petisco ou moída, na forma de farinha)	Norte (AM); Nordeste (PB, PE); Centro-Oeste (GO); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR)	Cultivada, em fase inicial
Cubiu	<i>Solanum sessiliflorum</i>	Solanaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (bombom, doce em calda, fermentado, geleia, iogurte, licor, mousse, sorvete, suco, torta). Fruto moído e desidratado pode ser usado como suplemento alimentar e fonte de fibras e pectinas	Norte (AM, AP, PA)	Colhida na natureza e cultivada
Cupuaçu	<i>Theobroma grandiflorum</i>	Malvaceae	Polpa do fruto (balas, bombom, frisanete, creme, doce, geleia, mousse, pão-de-mel, pavê, polpa congelada, sorvete, suco, torta); Semente (cupulate). À exceção do suco, as sementes, ricas em nutrientes, podem ser utilizadas junto com a polpa	Norte (AC, AM, PA, RO); Nordeste (MA);	Colhida na natureza, cultivada e com programa de melhoramento
Erva-mate	<i>Ilex paraguariensis</i>	Aquifoliaceae	Folhas ; Ramos jovens (desidratadas e moídas para chá, chimarrão, tererê). Finalmente moída e peneirada pode ser usada na panificação (biscoito, bolo, pão), no preparo de molhos para carnes, mousse, pudim, sorvete e na produção de cerveja	Nordeste (BA); Centro-Oeste (DF, MS, MT); Sudeste (MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Cultivada
Fisalis (Camapu)	<i>Physalis angulata</i> ; <i>P. pubescens</i>	Solanaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (doce, geleia, iogurte, licor, molho, sorvete, suco, torta). O fruto pode ser usado para decoração de tortas e doces finos, inclusive com o uso decorativo do envoltório (cálice) que envolve o fruto	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Colhida na natureza e cultivada
Gabiroba	<i>Campomanesia adamantium</i>	Myrtaceae	Casca do caule ; Folha (chá); Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (doce, geleia, iogurte, licor, molho, mousse, pavê, pudim, sorvete, suco, torta)	Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (MG, SP); Sul (PR, SC)	Colhida na natureza
Goiaba	<i>Psidium guajava</i>	Myrtaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (doce pastoso, doce de corte, doce em calda, geleia, iogurte, molho, sorvete, suco, torta)	Norte (AC, AM); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PE, PI, SE); Centro-Oeste (MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Cultivada
Goiaba-serrana	<i>Feijoa sellowiana</i>	Myrtaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (doce, geleia, iogurte, licor, molho, recheio para cuca, sorvete, suco, torta, além de cerveja e espumante)	Sudeste (RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Colhida na natureza e cultivada
Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	Myrtaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (doce, geleia, iogurte, licor, molho, mousse, sorvete, suco, torta)	Nordeste (BA); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, SC)	Colhida na natureza
Guabiroba	<i>Campomanesia xanthocarpa</i>	Myrtaceae	Casca do caule ; Folha (chá); Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (doce, geleia, iogurte, licor, molho agridoce, mousse, pavê, pudim, sorvete, suco, torta)	Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Colhida na natureza
Guaraná	<i>Paullinia cupana</i>	Sapindaceae	Semente (<i>in natura</i> - extrato, xarope); Semente torrada (bastão, pó, refresco, refrigerante, xarope)	Norte (AC, AM, PA)	Cultivada
Gueroba	<i>Syagrus oleracea</i>	Arecaceae	Palmito (<i>in natura</i> , conserva, empada, omelete, pastel, refogado, com peixe ou carne,); Polpa do fruto (<i>in natura</i> , doce, farinha, geleia, sorvete, suco); Semente (<i>in natura</i> , bolo, doce, farinha, óleo, pão)	Norte (TO); Nordeste (BA); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (MG, SP); Sul (PR)	Colhida na natureza e cultivada
Jabuticaba	<i>Plinia peruviana</i>	Myrtaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (cheesecake, doce, geleia, iogurte, licor, molho, mousse, passa, sorvete, suco, torta e, inclusive, cerveja, vinagre e vinho)	Nordeste (BA); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Cultivada
Jambu	<i>Acmella oleracea</i>	Asteraceae	Folha (água aromatizada ou adicionada em sucos verdes); Folhas ; Ramos jovens (caldeirada de peixe, guisado, panqueca, pão, patê, refogado, salada, sopa). Flores podem ser curtidas na cachaça para licor. Planta de uso comum em pratos típicos da Amazônia – ex. pato no tucupí e tacacá	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR); Nordeste (BA, CE, PB, PE, PI, RN, SE); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, SC)	Cultivada





Jaracatiá, Mamãozinho	Jacaratia spinosa	Caricaceae	Fruto (in natura ou cristalizado); Polpa do fruto (doce, geleia, licor, mousse, passa, sorvete); Medula dos ramos; Caule (bolo, doce, doce em calda, farofa, pão, pudim, rapadura). O leite do fruto verde é utilizado como amaciante de carnes	Norte (AC, AM, AP, PA, RO); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE); Centro-Oeste (GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Colhida na natureza
Jaracatiá, Mamão-do-mato	Vasconcellea quercifolia	Caricaceae	Fruto (in natura); Polpa do fruto (doce, geleia, mousse, passa, sorvete e amaciante de carnes); Medula dos ramos; Caule (bolo, doce, doce em calda, farofa, pudim). O leite do fruto verde é utilizado como amaciante de carnes	Nordeste (BA, CE, SE); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Colhida na natureza
Jatobá	Hymenaea courbaril; H. stigonocarpa	Fabaceae	Casca (chá). Polpa do fruto (biscoito, bolo, creme, doce, farinha, farofa, geleia, licor, pão, pudim, sorvete, torta)	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR)	Colhida na natureza
Jenipapo	Genipa americana	Rubiaceae	Fruto (in natura, cristalizado); Polpa do fruto (bolo, compota, doce em calda, geleia, licor, pão, sorvete, suco, vinho). O fruto verde (de vez) fornece corante azul, que pode ser utilizado no preparo de alimentos, a ex. de pães e bolos	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, SC)	Colhida na natureza
Juçara	Euterpe edulis	Arecaceae	Palmito (somente a partir de plantios); Polpa do fruto (doce, fermentado, geleia, licor, molho, pudim, sorvete, suco)	Nordeste (BA); Centro-Oeste (GO, MS); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Colhida na natureza e cultivada
Jurubeba	Solanum scuticum	Solanaceae	Fruto (conserva para acompanhamento de pratos)	Norte (AC, RO); Nordeste (BA); Centro-Oeste (DF, GO, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, SC)	Colhida na natureza
Licuri	Syagrus coronata	Arecaceae	Amêndoa (in natura, óleo); Polpa do fruto (doce, geleia, sorvete, suco)	Nordeste (AL, BA, PE, SE); Sudeste (MG)	Colhida na natureza
Macaúba	Acrocomia aculeata	Arecaceae	Amêndoa (in natura, óleo ou torrada); Polpa do fruto (in natura, bolo, cocada, creme, doce, farinha, geleia, mousse, óleo, paçoca doce, sorvete)	Norte (AM, PA, RR); Nordeste (BA, MA, PI); Centro-Oeste (DF, GO, MT); Sudeste (MG, RJ, SP)	Colhida na natureza, cultivada e com programa de melhoramento
Major-gomes (Cariru)	Talinum fruticosum; T. paniculatum;	Talinaceae	Folhas e Ramos jovens (in natura (salada) ou cozidas (bolinho, bolo salgado, creme, ensopado, omelete, panqueca, pão, refogado, risoto, suflê, torta salgada); Semente (saladas, pão)	Norte (AC, AM, PA, RO, RR); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE); Centro-Oeste (GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Cultivada
Mandacaru	Cereus jamacaru	Cactaceae	Fruto (in natura); Polpa do fruto (compota, geleia, licor)	Norte (TO); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE); Centro-Oeste (GO); Sudeste (MG)	Colhida na natureza
Mandioca	Manihot esculenta	Euphorbiaceae	Folha cozida (maniçoba); Raiz - in natura (bolo, farinha, fécula, goma, polvilho, tucupi) ou cozida	Norte (AC, AM, AP, PA, RO); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PE, PI); Centro-Oeste (DF, GO, MT); Sudeste (MG, SP)	Cultivada
Mangaba	Hancornia speciosa	Apocynaceae	Fruto (in natura); Polpa do fruto (doce em calda, geleia, iogurte, licor, molho, mousse, polpa congelada, sorvete, suco, torta, vinho)	Norte (AM, AP, PA, RO, TO); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR)	Colhida na natureza
Mangarito	Xanthosoma riedelianum	Araceae	Rizoma (assado, cozido, frito, purê, sopa). Pode ser utilizado como integrante de massa de pães, a exemplo de pãezinhos de mangarito, sem glúten	Sudeste (MG, RJ, SP)	Cultivada
Mapati	Pourouma cecropiifolia	Urticaceae	Fruto (in natura, após a retirada da película); Fruto com casca (preparo de bebidas fermentadas - frisante); Polpa do fruto (geleia, licor, mousse, sorvete, suco, vinho); Sementes, após torradas e moidas (farinha/pó) podem ser usadas para o preparo de bebida semelhante ao café, bem como para bolo e pudim	Norte (AC, AM)	Colhida na natureza
Maracujá	Passiflora actinia; P. alata; P. cincinnata; P. edulis; P. setacea; P. nitida	Passifloraceae	Casca (farinha); Fruto (in natura); Polpa do fruto (doce, geleia, iogurte, mousse, polpa congelada, refogado, sorvete, suco); Semente (balas)	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, SP, RJ); Sul (PR, RS, SC)	Cultivada, colhida na natureza (P. nitida)
Mini-pepininho	Melothria pendula	Cucurbitaceae	Fruto - in natura (pickles, salada) ou cozido	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Cultivada
Murici	Byrsonima crassifolia; B. verbascifolia	Malpighiaceae	Fruto (in natura); Polpa do fruto (bolo, doce, fermentados, geleia, iogurte, frisante, licor, molho, mousse, pavê, polpa congelada, pudim, purê, recheio de carne, sopa, sorvete, suco, torta)	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, SP); Sul (PR)	Colhida na natureza, cultivada e com programa de melhoramento
Ora-pro-nobis	Pereskia aculeata	Cactaceae	Folhas; Ramos jovens - in natura (salada), cozida (ensopado, omelete, pão, refogado, salada, torta salgada e ainda como acompanhante de diferentes tipos de carnes) ou seca (farinha); Flores jovens (salada, salteada – pura ou com carnes, omelete); Fruto (doce, geleia, licor, mousse, suco); Sementes (germinadas para produção de brotos para salada)	Nordeste (AL, BA, CE, MA, PE, SE); Centro-Oeste (GO); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Cultivada
Pajurá	Couepia bracteosa	Chrysobalanaceae	Fruto - in natura ou processado (triturado com água, leite ou adicionado ao suco de outras frutas). Polpa (triturada e refogada com ricota para obtenção de patê ou preparo de bolo ou pudim, além de mistura da polpa com doce de leite. Importante opção para o preparo de doces em geral e sorvete	Norte (AM, AP, PA, RO)	Colhida na natureza
Patauá	Oenocarpus batava	Arecaceae	Polpa do fruto (geleia, mousse, óleo (similar ao azeite de oliva), sorvete, suco, vinho-de-patauá)	Norte (AC, AM, PA, RO)	Colhida na natureza
Peperomia	Peperomia pellucida	Piperaceae	Folhas e Ramos jovens (in natura ou refogada). Verdura tenra, com alto potencial como hortaliça folhosa. Partes frescas ou desidratadas podem ser usadas para o preparo de chá, em infusão	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, SE); Centro-Oeste (GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, SC)	Colhida na natureza
Pequi	Caryocar brasiliense; C. coriaceum	Caryocaraceae	Polpa da semente (bolo, conserva, doce, farinha, farofa, licor, óleo (similar ao azeite de dendê), sorvete, suco). Muito usado em preparados de arroz, risoto e cozidos de carne). Amêndoa - in natura (consumo direto, óleo, paçoca, pão) ou torrada (farinha, farofa, pão)	Norte (PA, TO); Nordeste (BA, CE, MA, PE, PI); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (MG, SP); Sul (PR)	Colhida na natureza, com programas de melhoramento
Pera-do-cerrado	Eugenia klotzschiana	Myrtaceae	Fruto (in natura); Polpa do fruto (doce, geleia, iogurte, licor, molho, mousse, sorvete, suco, torta)	Centro-Oeste (DF, GO, MS); Sudeste (MG, SP)	Colhida na natureza
Pitanga	Eugenia uniflora	Myrtaceae	Fruto (in natura); Polpa do fruto (doce, geleia, iogurte, licor, molho, mousse, sorvete, suco, torta)	Nordeste (AL, BA, SE); Centro-Oeste (MS); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Cultivada
Pupunha	Bactris gasipaes	Arecaceae	Palmito; Fruto - cozido (farinha (panificação de biscoito, bolo, macarrão), purê, sorvete, suco); Fruto - in natura (óleo – tipo oleico); Semente (óleo – tipo láurico)	Norte (AC, AM, PA, RO); Centro-Oeste (MT)	Colhida na natureza e cultivada
Puxuri, puchuri	Licaria puchury-major	Lauraceae	Folhas – frescas ou secas (chá); Sementes – secas raladas - pratos doces (bolo, chocolates finos) ou pratos salgados (caldos de galinha, molho, purê, sopa). Condimento similar à noz-moscada	Norte (AM, PA)	Colhida na natureza
Sapota	Matisia cordata	Malvaceae	Fruto (in natura); Polpa do fruto (doce, geleia, iogurte, licor, mousse, polpa congelada, purê, pudim, sorbet, sorvete, suco, torta); Semente -torrada (consumo direto ou na forma de farinha)	Norte (AM, PA, RO); Sudeste (RJ)	Colhida na natureza
Sete-capotes	Campomanesia guazumifolia	Myrtaceae	Fruto (in natura); Polpa do fruto (doce, geleia, iogurte, licor, molho, mousse, polpa congelada, sorvete, suco, torta)	Nordeste (BA); Centro-Oeste (MS); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Colhida na natureza, com programas de melhoramento
Sorva	Couma utilis	Apocynaceae	Fruto (in natura, cristalizado ou desidratado); Polpa do fruto (doce, sorvete); Latex (diluído ou não, pode ser ingerido puro,	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR)	Colhida na natureza

			com café ou em mingau. É ainda relevante para a fabricação de goma de mascar		
Taioba	<i>Xanthosoma taioba</i>	Araceae	Folhas jovens; Pecíolos (talos) - cozidas (fritata, molho, omelete, panqueca, refogado, suflê, torta salgada e acompanhante de pratos a base de carnes); Rizoma - cozido (bolo, purê), assado, frito ou ainda processado (farinha)	Nordeste (CE, PE); Sudeste (ES, MG); Sul (PR, SC)	Cultivada
Tucumã	<i>Astrocaryum aculeatum</i> ; <i>A. vulgare</i>	Arecaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Palmito; Polpa do fruto (bolo, doce, farofa, geleia, óleo, patê, refresco, sanduiche, sorvete, tapioca); Amêndoa (óleo e, se torradas e moidas, podem se usadas para o preparo do café de tucumã)	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO); Nordeste (MA); Centro-Oeste (GO, MT)	Colhida na natureza
Umari	<i>Poraqueiba sericea</i>	Metteniusaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (doce, geleia, mousse, patê); Semente (bolo)	Norte (AC, AM, AP, PA)	Colhida na natureza
Umbu	<i>Spondias tuberosa</i>	Anacardiaceae	Folhas jovens (salada, suco); Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (compota, doce, geleia, iogurte, licor, molho, mousse, polpa congelada, sorvete, suco, torta, umbuzada)	Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE); Sudeste (ES, MG)	Colhida na natureza e cultivada
Umbu-cajá	<i>Spondias bahiensis</i>	Anacardiaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (compota, doce, geleia, iogurte, licor, molho, polpa congelada, sorvete, suco, torta)	Nordeste (AL, BA, PE, SE)	Colhida na natureza
Urtiga	<i>Urera caracasana</i>	Urticaceae	Folhas (cozidas, com arroz, empanadas, fritas, a milanesa ou em sopas,); Inflorescências jovens (empanadas e fritas ou assadas). Fazer branqueamento antes do uso; As folhas podem ser lavadas e processadas em liquidificador com água e fubá e cozidas	Norte (AC, AM, PA, RO, RR, TO); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PE, PI, SE); Centro-Oeste (GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, SC)	Colhida na natureza
Urucum	<i>Bixa orellana</i>	Bixaceae	Semente (condimento, corante)	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO); Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE); Centro-Oeste (DF, GO, MS, MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Cultivada
Uvaia	<i>Eugenia pyriformis</i>	Myrtaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (doce, geleia, iogurte, licor, polpa congelada, sorvete, suco, torta)	Centro-Oeste (GO, MS); Sudeste (MG, RJ, SP); Sul (PR, RS, SC)	Colhida na natureza
Uxi	<i>Endopleura uchi</i>	Humiriaceae	Fruto (<i>in natura</i>); Polpa do fruto (bolo, creme, doce, geleia, iogurte, licor, molho, mousse, óleo (similar ao azeite de oliva), sorvete, suco, torta)	Norte (AC, AM, AP, PA, RO, TO)	Colhida na natureza, com programas de melhoramento

1 Segundo estudos atuais, o amendoim (amplamente cultivado nas diversas regiões do país) é considerado um cultígen, originário de cruzamento entre *Arachis duranensis* e *A. ipaensis*. Apesar dessas espécies não serem consideradas nativas do país, o amendoim já se encontrava em cultivo no território brasileiro antes do descobrimento.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

